





(李健頤)

**○羊毛針痛**  
 羊毛針痛。方書少見。胸腹板痛。難癒。此法驗過多人。原梁隔酒四兩。燈草七團。以燒酒隔水燒熱。不令其干。燈草置于隔內。先取一團。放在胸臆痛處。用手圓轉。草冷更換。如此輪流酒盡痛止。其毛入燈草內。俟後永不再痛。

人在氣交之中。日受暑氣。夜感寒冷。胃失倉廩之權。腸失收盛之職。蒸熱之氣。擾亂中宮。中土不安。胃之神經受反噬之威感。遂爲吐瀉。王孟英治霍亂分寒熱二種。療用理中爲主。輔用連不爲君。然寒此症。用藥大相懸殊。苟有差錯。立致危事。因之醫士遇有此症發生。惶惶之間。每余以專受其亂。用藥多所不及者何也。蓋以無實驗之良方故也。余是以專心研究。冀以閱歷多年。深知霍亂一症是由寒暑二氣。擾亂其中。並非真熱寒寒之症。用藥宜寒熱兼配。庶幾捷效。鄙人發明用。半夏藿香沙不連乾薑吳興蘆根天滑石竹茹澤瀉佩蘭葉黃土水滾鹽水各半合煎。如吐瀉甚者。用西藥沙羅(Salo)單寧酸(Acetan Tannin)。次消酸者鉛(Bismuth Subnitrate)各一厘。調和共均作六包。每服一包。服後再服煎藥一杯。隔一小時再服。服至一小時。其吐即止。如口渴甚者。宜與淡鹽湯。切不可服米湯。因恐米湯有助火之害。去年平潭霍亂盛行。余以此法救治多人。功著彰彰。特藏登醫報。以冀流傳。

本書 內分 四十 二門

中傷咳嗽溫風寒嗽肺病  
黃脾暴厥喉痹疰氣痛門痺  
瘧五虛三咳淋瀝疥癩瘡門  
疳疔便痰遺精氣血閉飲積  
口目穢五疳噎病病瘕瘵瘵  
毒瘡瘡痔牙舌疽瘰癧瘰癧  
一。祇洋萬精附全外收一言。書大元。用羊奇辛。定完諸費入特價十典一角值六路三一發報辛南六三上行館福路雲馬海代局書署駐海上



(六廿)

更武裝感情發牢騷  
檢藥及立志圖整頓

第五回

便將前任醫官燕納章留下藥笈和藥箱。打開來看。我前直大失所望。統共計算。藥品只有三十餘種。不過阿司必林。蘇打明片。鈣磷寶石炭酸。補酒等品。貴重藥品。一點都沒有。器械有多少呢。把你一嚇。把我倒栽葱。一把外科刀。一把鉗子。一把剪子。兩根探針。而已矣。把我老爺弄昏了。這樣就看病了嗎。就是有了。一個極普通的攪彈傷。也沒有辦法了。這樣糊裏糊塗。軍醫的能事。就算畢了嗎。怪不待昨天聽到營黨部幹事高天祥說窮書記富軍需。邱不郎當是軍醫。原來當軍醫。在軍隊中。是惹人看不起的。再想想軍醫這樣糊裏糊塗。怪不得去年我們在城內開醫院時。軍隊過境。有病都到我們那裏去醫治。唉。倒霉倒霉了。我早曉得軍醫。是這樣想的。把我的良心拿出來。整頓整頓。去到軍醫處長那裏交涉交涉。把藥品器械增加一點。千不講究萬不講究。都要把書通用的。備個大差不差。於是將此種情形。報告居長。居長長說。你弄個呈文給處長。請他補發吧。我便弄了一個呈文。派得令兵送過去。停了兩天。我再到軍醫處去問問。那位陳司藥說。處長到上海去購藥了。

\*\*\*\*\*

三 無時冷淚

無時冷淚。水不俱傷。此幽陰之深患。其爲病也非常。然斯疾每出不意。非青盲  
分即內障。

此症只是時常流出冷淚。久則昏渺。乃精血衰之人。及悲泣久鬱婦人。肝氣  
漸弱。腎水不足。幽陰已甚。

菊花丸——甘菊已戟抱杞蓉。煉蜜如丸青鹽送。

清血飲——左歸飲——歸芪六君合生服

四 無時熱淚

無時熱淚。其禍幽微。此症耗中有伏火。乃不足之有餘。服涼寒則傷汁損血。服  
熱藥則血壅難消。當以意中求取補益。當而消治。

虛症只是熱淚。無時而常流也。蓋肝胆腎水耗。而陰精虧。及勞心竭力。  
過慮深思。動火傷汁。

當歸飲子——熱淚頻頻無時傾。緣因過慮與勞心。黃芩甘芍柴胡滑。錦紋人參當  
歸飲。

熱淚洗心湯——熱淚紅腫病在心。芩連夏麻連梔劑。  
治熱淚如糊。粘上下眼皮。有紅有腫。罔不見日。夜見燈花。泊即湧出。病在心也。

移淚瀉肝湯——移淚瀉肝紅肺金。桑芍夏麥杞賊葷。  
治移淚如糊。粘兩眼眵。赤腫而移。且生贅肉。病在肺也。

本兩集由第二年幸福報全年村料裝訂而成每集共一百頁計三十萬言由全國數百位名醫述內容所載完全切合實用無論內外婦幼花柳等症以及一切急難自療法莫不應有盡有得此「書小病能自行治療大病免藥石亂投稱之爲「康健保障」」誰曰不宜每集售價大洋一元存書無多欲購從速

總發行所上海三馬路雲南路口幸福報館

預防時疫佩帶驗方  
(徐祝三)

鮮地黃蒸陳芫花（在屋上隔年則佳）瓦上煨存性。與地椒蟲搗爛。用膏藥貼上。未潰即消。已潰即斂。此方黃樹桂先生抄與余伯。郭峻岐。峻岐係無錫國學專修館。畢業生。患瘰癧多年已潰。遍延名醫之效。其師唐文治先生。猶入滬上著名西醫院。醫治之效。得此方後半月即愈。

○**幼科驗方一束** 楊野鶴

1.小兒鎖喉風方  
用美蓉葉搗汁。煮雞蛋。搗爛。貼額門肚臍兩處。即愈。

2.小兒驚死方  
（一）用韭菜搗汁灌鼻中。刺者灌兩耳。（二）伏龍肝爲末。吹鼻中。（三）皂角

上春秋間過旱。冬天太冷。雨雪又太多。天時不正。恐今年夏季。時疫必盛。此證初起。都惡寒身熱。旋即神識昏迷。或頭項痛。或項強。種種不一。有一二日而死者。有五六日而死者。互相傳染。極爲可畏。鄙人悉心研究。已病者果有治法。未病者。思有以預防之。可以不致傳染。望各界照方合藥。人人佩帶。時時以此藥嗅之。則自無傳染之患。并希慎起居。節飲食。注意衛生之道爲要。附方

牙皂一錢 細辛一錢 辰砂一錢 公丁香一錢 麝香一分 山奈一錢 甘松一錢 貫仲一錢 天麻一錢 雄黃一錢 丹參一錢 虎頭骨一錢 廣木香一錢 降香一錢 蒼朮一錢 冰片五錢

右藥研末。每人用藥二錢。裝於布袋內。佩帶身上。時時持身鼻間嗅之。孕婦則忌。

○**預防時疫佩帶驗方**（徐祝三）